

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Bepanthen krema in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Bepanthen krema
3. Kako uporabljati zdravilo Bepanthen krema
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Bepanthen krema
6. Dodatne informacije

Bepanthen[®] 50 mg/g krema

dekspantenol



1. KAJ JE ZDRAVILO BEPANTHEN KREMA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Bepanthen krema vsebuje dekspantenol, ki se po nanosu z lahkoto in hitro absorbira. Dekspantenol se v kožnih celicah pretvori v pantotensko kislino (vitamin B₅), ki vstopa v sestavo koencima A in tako bistveno vpliva na tvorbo in obnovo epitelija. Spodbuja celično mitozo, pomaga pri tvorbi kolagenskih vlaken, pospešuje celjenje ran ter blaži vnetja.

Bepanthen krema ni mastna in se hitro vpija v kožo. Primerna je za vlažne kožne poškodbe, za nezaščiten kožo ter poraščeno kožo. Zlahka jo mažemo, zato je primerna za boleče sončne in druge manjše opekline.

Zdravilo Bepanthen krema uporabljamo za:

- nego suhe, hrapave ali razpokane kože
- nego dojk med dojenjem, zdravljenje vnetih in razpokanih prsnih bradavic
- nego dojenčka: preprečevanje in zdravljenje pleničnega izpuščaja
- pospeševanje celjenja in epitelizacije manjših poškodb (npr. manjše opekline in odrgnine), vzdražene kože (npr. po radioterapiji, fototerapiji ali izpostavljanju UV žarkom), kroničnih razjed in preležanin, analnih fisur, kožnih presadkov in erozije materničnega vratu
- nego kože med prekinitivno terapijo s kortikosteroidi in po njej

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO BEPANTHEN KREMA

Ne uporabljajte zdravila Bepanthen krema:

- če ste preobčutljivi za (alergični na) dekspantenol ali katerikoli sestavino zdravila Bepanthen krema.
- Za inficirane rane uporabljajte zdravilo Bepanthen plus krema.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Bepanthen krema

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi niso potrebni.

Uporaba drugih zdravil

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni poznano.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če uporabljate ali ste pred kratkim uporabljali katerikoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Nosečnost in dojenje

Zdravilo Bepanthen krema lahko uporabljate med nosečnostjo in dojenjem.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom preden vzamete katerikoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Bepanthen krema imelo vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Bepanthen krema

Propilenglikol lahko povzroči draženje kože.

Lanolin, stearilalkohol in cetilalkohol lahko povzročijo lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).



3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO BEPANTHEN KREMA

Pri uporabi zdravila Bepanthen krema natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nega suhe, hrapave ali razpokane kože: Bepanthen kremo nanašajte v tankem sloju enkrat ali večkrat na dan oziroma kolikor je potrebno.

Nega dojk med dojenjem: Bepanthen kremo nanesite na prsne bradavice po vsakem dojenju.

Nega dojenčka: Bepanthen kremo nanašajte dojenčkom pri vsakem previjanju na dobro umite in osušene predele, ki so pordeli ali prizadeti zaradi pleničnih izpuščajev.

Pospeševanje celjenja in epitelizacija manjših poškodb: Bepanthen kremo nanesite enkrat ali večkrat na dan oziroma po zdravnikovem navodilu.

Zdravljenje poškodovane cervikalne sluznice: Bepanthen kremo nanesite enkrat ali večkrat na dan po zdravnikovem navodilu.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.



4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Bepanthen krema neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po nanosu kreme se redko pojavijo kožne alergijske reakcije.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA BEPANTHEN KREMA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte v dobro zaprti tubi pri temperaturi do 30 °C.

Zdravila Bepanthen krema ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Bepanthen krema

- Zdravilna učinkovina je dekspentanol. 1 g kreme vsebuje 50 mg dekspantenola.
- Pomožne snovi so: DL-pantolakton, fenoksietanol, kalijev heksadecilhidrogenfosfat, cetilalkohol, lanolin (E 913), izopropilmiristat, propilenglikol, prečiščena voda

Izgled zdravila Bepanthen krema in vsebina pakiranja

Bepanthen krema je homogena emulzija tipa olje v vodi, bele ali rahlo rumenkaste barve z nespecifičnim vonjem.

Bepanthen krema je na voljo v škatli z aluminijasto tubo s PP zaporko s 30 g kreme.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Bayer Pharma d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Izdelovalec

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Str. 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Nemčija

Način in režim izdaje zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Navodilo je bilo odobreno 05.10.2006.



Bayer