

Calcium-Sandoz® forte

kalcij

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Calcium-Sandoz forte in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Calcium-Sandoz forte
3. Kako jemati zdravilo Calcium-Sandoz forte
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Calcium-Sandoz forte
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO CALCIUM-SANDOZ FORTE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Calcium-Sandoz forte je bogat vir kalcija, ki je pomemben mineral, nujen za tvorbo in vzdrževanje kosti.

Zdravilo Calcium-Sandoz forte se uporablja za preprečevanje in zdravljenje pomanjkanja kalcija, skupaj z drugimi zdravili pa se lahko uporablja za preprečevanje in zdravljenje bolezni, ki se imenuje osteoporoza (krhkost kosti).

Skupaj z vitaminom D₃ se Calcium-Sandoz forte uporablja tudi pri zdravljenju rahitisa (mehke kosti v obdobju rasti pri otrocih) in osteomalacije (mehke kosti pri odraslih).

Kalcij iz črevesja prehaja v kri, s katero se porazdeljuje po telesu. Ima pomembno vlogo pri mnogih telesnih funkcijah. Nujen je za delovanje živcev, mišic in srca ter za strjevanje krvi. Poleg tega ima pomembno vlogo pri delovanju mnogih hormonov. Da lahko kalcij opravlja vse svoje naloge, mora biti na voljo v ustreznih tkivih v primernih koncentracijah.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO CALCIUM-SANDOZ FORTE

Ne jemljite zdravila Calcium-Sandoz forte

- če ste alergični na kalcij in katerokoli sestavino zdravila (glejte seznam vseh sestavin v poglavju 6 na koncu navodila za uporabo);
- če imate povečano koncentracijo kalcija v krvi (hiperkalcemija);
- če v preveliki meri izločate kalcij s sečem (hiperkalciurija);
- če imate težave z ledvicami, vključno z ledvičnimi kamni (nefrolitiazis) in odlaganjem kalcija v ledvičnem tkivu (nefrokalcinoza).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Calcium-Sandoz forte

- Če imate ledvično obolenje, lahko jemljete zdravilo Calcium-Sandoz forte le po posvetu z zdravnikom, še posebno če jemljete zdravila, ki vsebujejo aluminij.
- Ne jemljite pripravkov z vitaminom D skupaj z zdravilom Calcium-Sandoz forte ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta, ker lahko kalcij in določena druga zdravila ob sočasnem jemanju medsebojno učinkujejo.

- Če jemljete ali ste pred kratkim jemali kardiotonične glikozide, tiazidne diuretike ali kortikosteroide, morate natančno upoštevati zdravnikova navodila.
- Če jemljete peroralne bifosfonate ali natrijev fluorid, vzemite zdravilo Calcium-Sandoz forte vsaj 3 ure po jemanju teh zdravil.
- Če jemljete katerega od antibiotikov iz skupine tetraciklinov, vzemite Calcium-Sandoz forte vsaj 2 uri po ali 4 do 6 ur pred jemanjem tetraciklinov.

Jemanje zdravila Calcium-Sandoz forte skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Calcium-Sandoz forte ne smete jemati vsaj 2 uri po uživanju hrane, ki vsebuje veliko oksalne ali fitinske kisline npr. špinaca, rabarbara in polnovredne žitarice.

Nosečnost in dojenje

- Če ste noseči ali dojite, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete zdravilo Calcium-Sandoz forte.
- Calcium-Sandoz forte lahko uporabljate med nosečnostjo in dojenjem v primeru pomanjkanja kalcija. V splošnem je ustrezen dnevni vnos (vključno s hrano in dodatki) za nosečnice in doječe matere 1000 – 1300 mg kalcija. Celotni dnevni vnos kalcija med nosečnostjo in dojenjem ne sme preseči 1500 mg.
- Kalcij prehaja v materino mleko, vendar to nima negativnega vpliva na dojenčka.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi jemanje zdravila Calcium-Sandoz forte vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Calcium-Sandoz forte

- Zdravilo Calcium-Sandoz forte je primerno tudi za bolnike s sladkorno boleznijo (ena šumeča tableta vsebuje 0,002 ogljikohidratnih enot).
- Bolniki, ki ste na dieti z manjšim vnosom natrija, se morate posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Calcium-Sandoz forte. Vsaka tableta zdravila Calcium-Sandoz forte vsebuje 68,45 mg natrija.
- Če menite, da imate intoleranco za katerega od sladkorjev, se pred uporabo zdravila Calcium-Sandoz forte posvetujte z zdravnikom.
- Zdravilo Calcium-Sandoz forte vsebuje tudi aspartam, ki je izvor fenilalanina in je lahko škodljiv za ljudi s fenilketonurijo.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO CALCIUM-SANDOZ FORTE

Kot pri vseh ostalih zdravilih tudi v primeru Calcium-Sandoz forte natančno upoštevajte vsa navodila, da bo zdravilo učinkovito.

- Otroci lahko vzamejo po 1 šumečo tableto (enkratni odmerek) enkrat ali dvakrat dnevno (ustreza 500-1000 mg kalcija).
- Odrasli lahko vzamejo po 1 šumečo tableto (enkratni odmerek) enkrat, dvakrat ali trikrat dnevno (ustreza 500-1500 mg kalcija).

Šumečo tableto zdravila Calcium Sandoz raztopite v kozarcu vode (približno 200 ml) in takoj popijte. Tablete ne pogoltnite cele niti je ne žvečite. Zdravilo Calcium-Sandoz forte lahko jemljete s hrano ali brez nje (glejte poglavje „Jemanje zdravila Calcium-Sandoz forte skupaj s hrano in pijačo“ za nadaljnja navodila).

Kako dolgo morate jemati zdravilo Calcium-Sandoz forte

Zdravilo Calcium Sandoz lahko v ustreznih dnevni odmerkih jemljete tako dolgo, kot vam je to svetoval zdravnik. Ker se zdravilo Calcium-Sandoz forte uporablja za preprečevanje in zdravljenje pomanjkanja kalcija in če ga jemljemo skupaj z ostalimi zdravili za preprečevanje in zdravljenje bolezni, imenovane osteoporoza (krhkost kosti), je verjetno, da bo zdravljenje dolgoročno.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Calcium-Sandoz forte, kot bi smeli

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, se lahko pojavijo simptomi, kot so slabost, bruhanje, žeja ali zaprtost. Če sumite, da ste vzeli prevelik odmerek zdravila Calcium-Sandoz forte, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Calcium-Sandoz forte

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Calcium-Sandoz forte neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

• Zelo redki neželeni učinki (pojavi se pri manj kot 1 od 10.000 oseb) vključujejo:

– hude alergijske reakcije, kjer pride do otekanja obraza, ustnic, jezika in/ali žrela, kar lahko povzroča težave pri požiranju.

Če se pri vas pojavi katerikoli od zgoraj naštetih alergijskih reakcij, takoj PRENEHAJTE jemati zdravilo Calcium-Sandoz forte in se posvetujte z zdravnikom.

• Redki neželeni učinki (pojavi se pri manj kot 1 od 1.000 oseb) vključujejo:

– slabost, drisko, bolečine v trebuhu, zaprtost, vetrove, bruhanje, srbenje, rdečino in/ali pekoč občutek na koži.

• Občasni neželeni učinki (pojavi se pri manj kot 1 od 100 oseb) lahko vključujejo:

– izrazito povečano koncentracijo kalcija v krvi (hiperkalcemija) ali preveliko izločanje kalcija s sečem (hiperkalcirija).

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CALCIUM-SANDOZ FORTE

• **Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

• Rok uporabnosti:

Zdravila Calcium-Sandoz forte ne smete jemati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in na dnu vsebnika. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

• Pogoji shranjevanja:

Shranjujte v originalni obojnini. Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjinske odpadke.

O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Calcium-Sandoz forte

Zdravilni učinkovini sta kalcijev laktat glukonat in kalcijev karbonat.

Vsaka šumeča tableta zdravila Calcium-Sandoz forte vsebuje 1132 mg kalcijevega laktata glukonata in 875 mg kalcijevega karbonata (kar ustreza 500 mg kalcija).

Pomožne snovi so brezvodna citronska kislina, prašek z aromo pomaranče (vsebuje: eterična olja pomaranče, maltodekstrin, arabski gumi, sorbitol (E 420), dekstrozo), aspartam (E951), makrogol 6000 in natrijev hidrogenkarbonat.

Izgled zdravila Calcium-Sandoz forte in vsebina pakiranja

Šumeče tablete so bele in okrogle z značilnim vonjem pomaranče.

Zdravilo Calcium-Sandoz forte je na voljo v pakiranjih po 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 in 600 šumečih tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdaje zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija:	Calcium „Sandoz“ forte – Brausetabletten
Belgija:	Sandoz Calcium, bruistabletten
Ciper:	Calcium-Sandoz Forte 500mg Effervescent Tablets
Češka:	CALCIUM-SANDOZ® FORTE 500mg
Danska:	Calcium-Sandoz, brusetabletter
Finska:	Calcium-Sandoz, 500mg poretabletti
Francija:	CALCIUM SANDOZ 500mg, comprimés effervescents
Nemčija:	Calcium-Sandoz® forte 500mg
Madžarska:	Calcium-Sandoz pezsgőtableta
Islandija:	Calcium-Sandoz, freyðitöflur
Italija:	CALCIUM-SANDOZ 500mg compresse effervescenti
Nizozemska:	Sandoz Calcium forte, bruistabletten
Norveška:	Calcium-Sandoz® 500mg brusetabletter
Poljska:	CALCIUM-SANDOZ Forte
Portugalska:	CALCIUM-SANDOZ® FORTE
Slovaška:	CALCIUM-SANDOZ® Forte 500 mg
Slovenija:	Calcium-Sandoz forte
Španija:	Calcium Sandoz Forte 500 mg comprimidos efervescentes
Švedska:	Calcium-Sandoz 500 mg, brustabletter

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana

Izdelovalec

Lek d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Navodilo je bilo odobreno

22.1.2009

SI 903702

41996-03200901/SI

 NOVARTIS