

## Danalac GOAT 1 začetno mleko za dojenčke na osnovi kozjega mleka od rojstva naprej

**Danalac GOAT 1** se lahko uporablja kot samostojna hrana za dojenčke od rojstva dalje, če jih matere ne dojijo ali kot dopolnilna hrana, če dojenje ne zadošča. Po 6. mesecu starosti je priporočljivo, da začetno mleko Danalac GOAT 1 postopoma zamenjate z nadaljevalnim mlekom Danalac GOAT 2. Danalac GOAT 1 je edinstvena formula na osnovi kozjega mleka, ki vsebuje vse pomembne sestavine v prvih mesecih življenja, ter jih dojenček sam ne more tvoriti dovolj. **Pomembno obvestilo: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka.** Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje s strokovnjakom s področja medicine, farmacije ali prehrane oz. drugih strokovnjakov s področja nege matere in otroka. Danalac GOAT 1 je lahko edini vir prehrane dojenčkov od rojstva dalje. Steklenička za hranjenje naj ne bo vašemu otroku nadomestilo za dudo »tlačilnik«. Danalac GOAT 2 vsebuje oglikovne hidrate, kateri ob pogostem ali stalnem kontaktu z zobmi lahko povzročijo zobno gnilobo in druge s tem povezane težave. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično pije. **Sestavine: polnomastno kozje mleko v prahu 31 %, laktoza, koncentrat sirotkinih beljakovin,** rastlinska olja (viskoooleinsko sončnično, kokosovo, repično, koruzno), **galaktooligosaharidi, ribje olje** (vir dokozaheksaenojske kisline), olje glive *Mortierella Alpina* (vir arahidonske kisline), kalcijeve soli ortofosforne kisline, frukto-oligosaharidi, holin bitartrat, kalijev citrat, vitamini (L-askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, folna kislina, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin), natrijev klorid, inozitol, nukleotidi (citiadin, adenozin-5'-monofosforna kislina, uridin-5', inozin-5'-monofosfat dinatrijeva sol, gvanozin-5'-monofosfat dinatrijeva sol), emulgator (**sojin lecitin**), železov sulfat, cinkov sulfat, taurin, L-karnitin, magnezijev klorid, antioksidant (askorbilpalmitat), bakrov sulfat, manganov sulfat, antioksidant (citronska kislina), kalijev jodid, natrijev selenit. **Informacije o alergenihi: vsebuje sojo, mleko, ribe.** Vsebuje DHA\*. \*Začnsko prepisano za vse mlečne formule za dojenčke.

**Priprava obroka:** Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Vsaki pripravite svež obrok v steklenički in takoj nahranite otroka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pazorno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Zaradi možnosti pregretja ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici.

1. Vedno si umijte roke in vse pripomočke, ki jih boste uporabili.
2. Stekleničko in dudo sterilizirajte v vreli vodi 10 minut.
3. Zavrite pitno vodo za 10 minut in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijite potrebno količino prekuhane vode.
4. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte do roba (ne pritiskajte). Uporabljajte le priloženo merico. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric hladilnika). Porabite v 3 tednih po odprtju.

Standardna raztopina: 12,6 g Danalac GOAT + 90 ml vode = 100 ml obroka. Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surovinah. \*iz laktoze; \*\* sol = natrij x 2,5 Ne vsebuje palmovega olja, GSO, umetnih arom, barvil in dodatkov, konzervansov in glutena.

**Proizvajala:** DANA Dairy Group LTD, Route de Pré-Bois 29, 1215 Ženeva, Švica.

**Distribuirala:** BioLek d.o.o., Moravci 34b, 9243 Mala Nedelja. Več informacij: [www.danalac.si](http://www.danalac.si)

**Tabela za hranjenje:** 0-6 mesecev (če zdravnik ne predpiše drugače).  
To so splošna navodila za pripravo; vaš dojenček pa lahko potrebuje več ali manj od navedenega.

Starost dojenčka	Število hranjenj na dan	Za 1 obrok potrebujete	
		količina vode (ml)	število meric Danalac GOAT 1
0-9 dni (dojenčki s težo manj kot 3,2 kg)	7	60	2
0 mesecev	6	90	3
1 mesec	6	120	4
2 meseca	6	120	4
3 meseci	6	150	5
4 meseci	5	150	5
5 mesecev	4	180	6

Do vrha napolnjena priložena merica vsebuje približno 4,2 g mleka Danalac. Uporabljajte le priloženo merico. Formule ne pripravljajte močnejše ali šibkeje koncentracije kot je navedeno. **Uporaba:** Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do: datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

**Neto: 400 g**

Hranilna vrednost in sestava na	100 g	100 ml
Energija, kJ/kcal	2140/512	270/65
Masčobe, g	27,7	3,5
Nasičene masčobne kisline, g	11,4	1,5
Mononenasičene masčobne kisline, g	11,3	1,4
Polinenasičene masčobne kisline, g	5	0,6
Linolna kislina, mg	4300	540
α-Linolenska kislina, mg	430	54
Arahidonska kislina, mg	129	16,3
Dokozaheksaenojska kislina, mg	129	16,3
Oglikovki hidrati, g	53	6,7
Sladkor *, g	53	6,7
Prebiotiki, g	3	0,38
Galakto-oligosaharidi, g	2,7	0,34
Frukto-oligosaharidi, g	0,3	0,04
Beljakovine, g	11,2	1,4
Sirotkine beljakovine, g	7,7	1
Kazein, g	3,5	0,4
Sol **, g	0,4	0,05
<b>Vitaminski:</b>		
Vitamin A, µg-RE	550	69,3
Vitamin D, µg	11	1,4
Vitamin E, mg α-TE	8	1
Vitamin K, µg	38,8	4,9
Tiamin, mg	0,42	0,05
Riboflavin, mg	1,4	0,18
Vitamin B6, mg	0,49	0,062
Vitamin B12, µg	1,9	0,24
Niacin, mg	4,5	0,6
Folna kislina, µg	167	21
Pantotenska kislina, mg	3,5	0,44
Vitamin C, mg	73	9,2
Biotin, µg	15	1,9
<b>Minerali:</b>		
Natrij, mg	161	20,3
Kalij, mg	505	63,7
Baker, mg	0,38	0,05
Magnezij, mg	40,6	5,1
Železo, mg	4,8	0,6
Cink, mg	4,8	0,6
Mangan, mg	0,12	0,015
Kalcij, mg	411	52
Fosfor, mg	270	34
Jod, µg	109	13,7
Klorid, mg	380	48
Selen, µg	19	2,4
Holin, mg	161	20,3
L-karnitin, mg	9,5	1,2
Inozitol, mg	49,2	6,2
Taurin, mg	15	1,9
Nukleotidi, mg	25,2	3,2