

Danalac GOAT 2 nadaljevalno mleko za dojenčke na osnovi kozjega mleka po dopolnjenem 6. mesecu

Danalac GOAT 2 nadaljevalno mleko je primerno za dojenčke, starejše od 6 mesecev. Primeren je kot dopolnilna hrana, če dojenje ne zadošča, in kot nadaljevalna hrana po uporabi Danalac GOAT 1 začetnega mleka. Po 12. mesecu starosti je priporočljivo, da nadaljevalno mleko Danalac GOAT 2 postopoma zamenjate z nadaljevalnim mlekom Danalac GOAT 3.

Pomembno obvestilo: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Če mati ne more dojit ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oz. drugim strokovnim osebjem. Danalac GOAT 2 je namenjen za posebne prehranske namene in se lahko uporablja kot del raznolike prehrane oz. kot dopolnilna hrana dojenčkov starejših od 6 mesecev. Nobene nadaljevalne formule ne smemo uporabljati v prvih 6 mesecih kot nadomestek za materino mleko. Steklenička za hranjenje naj ne bo vašemu otroku nadomestilo za dudo »tolažilko«. Danalac GOAT 2 vsebuje oglikovke hidrate, kateri ob pogostem ali stalnem kontaktu z zobmi lahko povzročijo zobno gnilobo in druge s tem povezane težave. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično pije.

Sestavine: polnomastno kozje mleko v prahu 32%, laktoza, koncentrat sirotkinih beljakovin, rastlinska olja (visokoolno sončnično, kokosovo, repično), galakto-oligosaharidi, ribje olje (vir *Morferella Alpina* (vir arahidonske kisline), kalcijeve soli ortofosforne kisline, fruktoooligosaharidi, kalijev citrat, vitamini (askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotemat, riboflavin, retinol acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, folna kislina, filokinin, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin), natrijev klorid, magnezijev klorid, emulgator (sojin lecitin), železov sulfat, cinkov sulfat, antioksidant (askorbilpalmitat), bakrov sulfat, manganov sulfat, antioksidant (citronska kislina), kalijev jodid, natrijev selenit.

Informacije o alergijih: vsebuje sojo, mleko, ribe. Vsebuje **DHA***. Zakonsko predpisano za vse mlečne formule za dojenčke.

Priprava obroka: Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Vsakič pripravite svež obrok v steklenički in takoj nahranite otroka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pazljivo spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Zaradi možnosti pregretja ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici.

1. Vedno si umijte roke in vse pripomočke, ki jih boste uporabili.
2. Stekleničko in dudo sterilizirajte v vreli vodi 10 minut.
3. Zavrite pitno vodo za 10 minut in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijte potrebno količino prekuhane vode.
4. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte do roba (ne pritisčajte). Uporabljajte le priloženo merico. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.
5. Stekleničko zaprite z zamaškom in jo stresajte. Namestite steriliziran cucelj. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C).
6. Stekleničko in dudo očistite takoj po uporabi. Ostanek hrane ne uporabljajte ponovno. Dobro zaprt izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (nev hladilniku). Porabitev 3 tednih po odprtju.

Proizvajalca: DANA Dairy Group LTD, Route de Pré-Bois 29, 1215 Ženeva, Švica.

Distribuiralca in prodajalca: BioLek d.o.o., Moravci 34b, 9243 Mala Nedelja.

Več informacij: www.danalac.si

Hranilna vrednost in sestava na	100 g	100 ml
Energija, kJ/kcal	2074/496	262/63
Maščobe, g	24,5	3,1
Nasičene maščobne kisline, g	9,7	1,2
Mononenasičene maščobne kisline, g	9,9	1,3
Polinenasičene maščobne kisline, g	4,9	0,6
Linolna kislina, mg	4200	500
α-Linolenska kislina, mg	420	53
Arahidonska kislina, mg	125	15,8
Dokozahexaenojska kislina, mg	125	15,8
Oglikovi hidrati, g	56	7,1
Sladkor *, g	56	7,1
Prebiotiki, g	2,9	0,37
Galakto-oligosaharidi, g	2,6	0,33
Frukto-oligosaharidi, g	0,3	0,04
Beljakovine, g	11,3	1,4
Sirotkine beljakovine, g	7,6	0,9
Kazein, g	3,7	0,5
Sol **, g	0,4	0,05
Vitaminski:		
Vitamin A, µg-RE	510	64
Vitamin D, µg	11	1,4
Vitamin E, mg α-TE	8	1
Vitamin K, µg	39	5
Tiamin, mg	0,44	0,06
Riboflavin, mg	1,3	0,16
Vitamin B6, mg	0,5	0,06
Vitamin B12, µg	1,9	0,24
Niacin, mg	4,8	0,6
Folna kislina, µg	167	21
Pantotenska kislina, mg	3,4	0,43
Vitamin C, mg	75	9,5
Biotin, µg	17	2
Minerali:		
Natrij, mg	160	20,2
Kalij, mg	542	68
Baker, mg	0,37	0,05
Magnezij, mg	49,4	6,2
Železo, mg	4,2	0,5
Cink, mg	3,8	0,5
Mangan, mg	0,13	0,02
Kalcij, mg	584	74
Fosfor, mg	384	48
Jod, µg	117	14,7
Klorid, mg	383	48
Selen, µg	18,5	2,3

Tabela za hranjenje: 6-12 mesecev (če zdravnik ne predpiše drugače).

To so splošna navodila za pripravo; vaš dojenček pa lahko potrebuje več ali manj od navedenega.

Starost dojenčka	Število hranjenj na dan	Za 1 obrok potrebujete	
		količina vode (ml)	število meric Danalac GOAT 2
6-9 mesecev	3-4	180	6
9-12 mesecev	2-3	180	6

Do vrha napolnjena priložena merica vsebuje približno 4,2 g mleka Danalac.

Uporaba: Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do: datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Standardna raztopina: 12,6 g Danalac GOAT + 90 ml vode = 100 ml obroka. Analitske vrednosti so odvisne od bioloških mihanj, običajnih pri naravnih surovinah. * iz laktoze, ** sol = natrij x 2,5. Ne vsebuje palmovega olja, GSO, umetnih arom, barvil in dodatkov, konzervansov in glutena.

Neto: 400 g