

## Danalac GOAT 2 nadaljevalno mleko za dojenčke na osnovi kozjega mleka po dopolnjenem 6. mesecu

Danalac GOAT 2 nadaljevalno mleko je primerno za dojenčke, starejše od 6 mesecev. Primeren je kot dopolnilna hrana, če dojenje ne zadošča, in kot nadaljevalna hrana po uporabi Danalac GOAT 1 začetnega mleka. Po 12. mesecu starosti je priporočljivo, da nadaljevalno mleko Danalac GOAT 2 postopoma zamenjate z nadaljevalnim mlekom Danalac GOAT 3.

**Pomembno obvestilo:** **Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka.** Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oz. drugim strokovnim osebjem. Danalac GOAT 2 je namenjen za posebne prehranske namene in se lahko uporablja kot del raznolike prehrane oz. kot dopolnilna hrana dojenčkov starejših od 6 mesecev. Nobene nadaljevalne formule ne smemo uporabljati v prvih 6 mesecih kot nadomestek za materino mleko. Steklenička za hranjenje naj ne bo vašemu otroku nadomestilo za dudo »tolažilko«. Danalac GOAT 2 vsebuje ogljikove hidrate, kateri ob pogostem ali stalnem kontaktu z zobmi lahko povzročijo zobno gnilobo in druge s tem povezane težave. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično piye.

**Sestavine:** polnomastno kozje mleko v prahu 32%, laktosa, koncentrat sirotkinih beljakovin, rastlinska olja (visokooleinsko sončično, kokosovo, repično, koruzno), galakto-oligosaharidi, ribje olje (vir dokozahckaenojske kislina), olje glive *Mortierella Alpina* (vir arahidonske kislina), kalcijeve soli ortofosforne kislina, fruktooligosaharidi, kalijev citrat, vitamini (askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, folna kislina, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin), natrijev klorid, magnezijev klorid, emulgator (**sojin lecitin**), železov sulfat, cinkov sulfat, antioksidant (askorbilpalmitat), bakrov sulfat, manganov sulfat, antioksidant (citronska kislina), kalijev jodid, natrijev selenit.

**Informacije o alergenih:** vsebuje sojo, mleko, ribe. Vsebuje DHA\*. \*Zakonsko predpisano za vse mlečne formule za dojenčke.

**Priprava obroka:** Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Vsakič pripravite svež obrok v steklenički in takoj nahranite otroka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pozorno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Zaradi možnosti pregretja ne pogrevajte obroka v mikrovalovnici pečici.

1. Vedno si umijte roke in vse pripomočke, ki jih boste uporabili.
2. Stekleničko in dudo sterilizirajte v vreli vodi 10 minut.
3. Zavrite pitno vodo za 10 minut in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijite potrebno količino prekuhanje vode.
4. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte do roba (ne pritiskajte). Uporabljajte le priloženo merico. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.
5. Stekleničko zaprite z zamaškom in jo stresajte. Namestite steriliziran cucelj. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C). Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite.
6. Stekleničko in dudo očistite takoj po uporabi. Ostankov hrane ne uporabljajte ponovno. Dobro zaprt izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 3 tednih po odprtju.

**Proizvaja:** DANA Dairy Group LTD, Route de Pré-Bois 29, 1215 Ženeva, Švica.

**Distribuira in prodaja:** BioLek d.o.o., Moravci 34b, 9243 Mala Nedelja.

Več informacij: [www.danalac.si](http://www.danalac.si)

**Tabela za hranjenje:** 6-12 mesecev (če zdravnik ne predpiše drugače).

To so splošna navodila za pripravo; vaš dojenček pa lahko potrebuje več ali manj od navedenega.

| Starost dojenčka | Število hranjenj na dan | Za 1 obrok potrebuje |                              |
|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
|                  |                         | količina vode (ml)   | število meric Danalac GOAT 2 |
| 6-9 mesecev      | 3-4                     | 180                  | 6                            |
| 9-12 mesecev     | 2-3                     | 180                  | 6                            |

Do vrha napolnjena priložena merica vsebuje biblično 4,2 g mleka Danalac.

**Uporaba:** Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do: datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Standardna raztopina: 12,6 g Danalac GOAT + 90 ml vode = 100 ml obroka. Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surovinah. \*iz laktoze; \*\*sol = natrij x 2,5. Ne vsebuje palmovega olja, GSO, umetnih arom, barvil in dodatkov, konzervansov in glutena.

**Neto:** 800 g

| Hranilna vrednost in sestava na    | 100 g    | 100 ml |
|------------------------------------|----------|--------|
| Energija, kJ/kcal                  | 2074/496 | 262/63 |
| Maščobe, g                         | 24,5     | 3,1    |
| Nasičene maščobne kisline, g       | 9,7      | 1,2    |
| Mononenasičene maščobne kisline, g | 9,9      | 1,3    |
| Polinenasičene maščobne kisline, g | 4,9      | 0,6    |
| Linolna kislina, mg                | 4200     | 500    |
| α-Linolenska kislina, mg           | 420      | 53     |
| Arahidonska kislina, mg            | 125      | 15,8   |
| Dokozahckaenojska kislina, mg      | 125      | 15,8   |
| Ogljikovi hidrati, g               | 56       | 7,1    |
| Sladkor *, g                       | 56       | 7,1    |
| Prebiotiki, g                      | 2,9      | 0,37   |
| Galakto-oligosaharidi, g           | 2,6      | 0,33   |
| Frukto-oligosaharidi, g            | 0,3      | 0,04   |
| Beljakovine, g                     | 11,3     | 1,4    |
| Sirotkine beljakovine, g           | 7,6      | 0,9    |
| Kazein, g                          | 3,7      | 0,5    |
| Sol **, g                          | 0,4      | 0,05   |
| Vitaminini:                        |          |        |
| Vitamin A, µg-RE                   | 510      | 64     |
| Vitamin D, µg                      | 11       | 1,4    |
| Vitamin E, mg α-TE                 | 8        | 1      |
| Vitamin K, µg                      | 39       | 5      |
| Tiamin, mg                         | 0,44     | 0,06   |
| Riboflavin, mg                     | 1,3      | 0,16   |
| Vitamin B6, mg                     | 0,5      | 0,06   |
| Vitamin B12, µg                    | 1,9      | 0,24   |
| Niacin, mg                         | 4,8      | 0,6    |
| Folna kislina, µg                  | 167      | 21     |
| Pantotenska kislina, mg            | 3,4      | 0,43   |
| Vitamin C, mg                      | 75       | 9,5    |
| Biotin, µg                         | 17       | 2      |
| Minerali:                          |          |        |
| Natrij, mg                         | 160      | 20,2   |
| Kalij, mg                          | 542      | 68     |
| Baker, mg                          | 0,37     | 0,05   |
| Magnezij, mg                       | 49,4     | 6,2    |
| Železo, mg                         | 4,2      | 0,5    |
| Cink, mg                           | 3,8      | 0,5    |
| Mangan, mg                         | 0,13     | 0,02   |
| Kalcij, mg                         | 584      | 74     |
| Fosfor, mg                         | 384      | 48     |
| Jod, µg                            | 117      | 14,7   |
| Klorid, mg                         | 383      | 48     |
| Selen, µg                          | 18,5     | 2,3    |