NAVODILO ZA UPORABO

Fluimukan 200 mg prašek za peroralno raztopino z okusom pomaranče

ACETYLCYSTEINUM

za lažje izkašljevanje

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
- Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 5 do 7 dneh, se posvetujete z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Fluimukan 200 mg in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Fluimukan 200 mg
3. Kako jemati zdravilo Fluimukan 200 mg
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Fluimukan 200 mg
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO FLUIMUKAN 200 mg IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Fluimukan 200 mg vsebuje acetilcistein. Acetilcistein spada v skupino zdravil, imenovanih mukolitiki. Uporablja se za lažje izkašljevanje in redčenje sluzi pri boleznih dihal z gosto sluzjo.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO FLUIMUKAN 200 mg

Ne jemljite zdravila Fluimukan 200 mg,
če ste alergični (preobčutljivi) na acetilcistein ali katerokoli sestavino zdravila.

Praška za peroralno raztopino Fluimukan 200 mg ne smejo jemati otroci, mlajši od 6 let.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Fluimukan 200 mg
- če se pojavijo spremembe na koži in sluznicah, se je treba posvetovati z zdravnikom in ustaviti zdravljenje,
- če imate astmo ali ste doživeli krč sapnic (bronhospazem),
- če imate razjedo na želodcu ali dvanajstniku (ulkus),

- če imate hujša jetrna obolenja (npr. cirozo jeter),
- če ste starejši in imate oslabljen refleks za kašelj ali če težko dihate,
- če imate histaminsko intoleranco, se morate izogniti dolgotrajnemu zdravljenju, saj se lahko pojavijo glavobol, vnetje nosne sluznice, srbenje.

Uporaba drugih zdravil
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Zdravilo Fluimukan 200 mg lahko vpliva na učinek nekaterih zdravil ali obratno. **Posebna previdnost je potrebna**, če poleg zdravila Fluimukan 200 mg sočasno uporabljate/jemljete:
- nekatere antibiotike, npr. aminoglikozidne antibiotike (npr. gentamicin, streptomicin, netilmicin, tobramicin), amfotericin B, peniciline (ampicilin, bakampicilin, karindacilin, piperacilin, epicilin), eritromicin, cefalosporine (cefaklor, cefadroksil, cefaleksin, cefradim, ceftazidim, cefsulodin), tetracikline (npr. doksiciklin, klortetraciklin), imipenem. V teh primerih naj bo med uporabo/zaužitjem antibiotika in zdravila Fluimukan 200 mg vsaj 2-urni presledek. To ne velja za cefiksim in lorakarbef.
- zdravila za zaviranje kašlja (antitusike). O ustreznosti sočasne uporabe teh zdravil in zdravila Fluimukan 200 mg se posvetujte s svojim zdravnikom, ker lahko zaradi oslabljenega refleksa kašljanja povzročijo nevarno zastajanje sluzi v dihalih;
- zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka ali srčnega popuščanja (t.i. zaviralci ACE, npr. lizinopril), ker acetilcistein zveča njihov učinek;
- gliceriltrinitrat, ki se uporablja za zdravljenje angine pektoris, ker lahko acetilcistein zveča njegov učinek na širjenje žil in preprečevanje strjevanja krvi;
- metoklopramid (zdravilo za lajšanje slabosti), ker lahko vodi do neželenih učinkov v krvi (sulfhemoglobinemije) ali do spremenjenega tonusa mišic;
- aktivno oglje (za pomoč pri zastrupitvah s hrano), ker zmanjša prehajanje acetilcisteina iz prebavil v kri.

Jemanje zdravila Fluimukan 200 mg skupaj s hrano in pijačo
Zdravilo vzemite po jedi.

Nosečnost in dojenje
Preden vzamete katerokoli zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravilo Fluimukan 200 mg med nosečnostjo lahko uporabljate le po nasvetu zdravnika. Med jemanjem zdravila naj matere ne dojijo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Zdravilo Fluimukan 200 mg ne vpliva na sposobnost upravljanja motornih vozil ali strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Fluimukan 200 mg
Zdravilo vsebuje saharozo in laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.
Zdravilo Fluimukan 200 mg lahko škoduje zobem (karies).

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO FLUIMUKAN 200 mg

Pri jemanju zdravila Fluimukan 200 mg natančno upoštevajte spodnja navodila. Če ste negotovi, se posvetujte s farmacevtom.

Odrasli in mladostniki, stari nad 14 let: naj vzamejo eno vrečko (3 g praška) 3-krat na dan, kar ustreza 600 mg acetilcisteina na dan. Največji dnevni odmerek je 600 mg acetilcisteina ali 3 vrečke zdravila Fluimukan 200 mg.

Otroci in mladostniki, stari od 6 do 14 let: naj vzamejo eno vrečko (3 g praška) 2-krat na dan, kar ustreza 400 mg acetilcisteina na dan. Največji dnevni odmerek je 400 mg acetilcisteina ali 2 vrečki zdravila Fluimukan 200 mg.

Zdravilo vzemite po jedi. Prašek raztopite v kozarcu vode in popijte vso raztopino.

Med jemanjem zdravila Fluimukan 200 mg morate piti dovolj tekočine (2 l vode dnevno). Priporočamo tudi vlažne inhalacije.

Če se zdravstveno stanje po 5 do 7 dneh jemanja zdravila Fluimukan 200 mg ne izboljša ali se celo poslabša, morate obiskati zdravnika.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Fluimukan 200 mg kot bi smeli,
se nemudoma posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zelo veliki odmerki lahko povzročijo želodčno-črevesne težave (slabost, občutek siljenja na bruhanje, bruhanje, drisko), krč sapnic ali preobčutljivostne reakcije.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Fluimukan 200 mg,
ga vzemite takoj, ko je to mogoče in nadaljujte z jemanjem ostalih odmerkov ob običajnem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadoknadili pozabljeni odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Fluimukan 200 mg neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite kar koli od spodaj navedenega, mu takoj prenehajte dajati zdravilo in o tem nemudoma obvestite zdravnika ali takoj pokličite najbližjo bolnišnico:
- otekanje rok, nog, gležnjev, obraza, ustnic, ust ali žrela, kar lahko povzroči težave pri požiranju ali dihanju,
- izpuščaji,
- omedlevica.

To so zelo hudi neželeni učinki. Njihov pojav je lahko znak zelo resne alergijske reakcije na acetilcistein ali druge sestavine zdravila. V takem primeru je potrebna nujna zdravniška pomoč.

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov): siljenje na bruhanje, bruhanje, zaspanost, omotičnost

Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov): utrujenost, vročina, glavobol, šumenje v ušesih, preobčutljivostne reakcije (izpuščaji, srbenje, prišč, nenaden pojav oteklin predvsem na obrazu, ustih, očeh ali v žrelu, kar lahko povzroči težave pri požiranju ali dihanju), hitrejše utripanje srca (tahikardija), znižan krvni tlak, zgaga, bolečine v trebuhu, driska, vnetje ustne sluznice

Redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov): oteženo dihanje, krč sapnic (predvsem pri astmatikih), zvišan krvni tlak, suha usta, lepljiva koža

Zelo redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov): hujše kožne reakcije, kašelj, izcedek iz nosu, zmanjšana sposobnost strjevanja krvi, anafilaktična reakcija, šok

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA FLUIMUKAN 200 mg

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.
Za shranjevanje zdravila ni posebnih temperaturnih omejitev.

Zdravila Fluimukan 200 mg ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »EXP:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Fluimukan 200 mg

- Zdravilna učinkovina je acetilcistein. Ena vrečka (3 g praška) vsebuje 200 mg acetilcisteina.
- Pomožne snovi so: saharoza, askorbinska kislina (E300, vitamin C), saharin (E954), aroma pomaranče (vsebuje laktozo monohidrat).

Izgled zdravila Fluimukan 200 mg in vsebina pakiranja
Škatla z 20 vrečkami s 3 g praška.
Prašek je bele barve z vonjem pomaranče.

Način in režim izdaje zdravila Fluimukan 200 mg
BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
Lek farmacevtska družba d. d.

Verovškova 57
1526 Ljubljana
Slovenija

Izdelovalec
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Nemčija

Navodilo je bilo odobreno
8. 6. 2012