

Mazilo proti hemoroidom

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Mazilo proti hemoroidom in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo proti hemoroidom
3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo proti hemoroidom
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Mazilo proti hemoroidom
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Mazilo proti hemoroidom in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Mazilo proti hemoroidom vsebuje benzokain, bizmutov subgalat, cinkov oksid, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice (*Chamomilla recutita* (L.) Rausch.), perujski balzam (balzam iz debel perujskega balzamorca (*Myroxylon balsamum* (L.) Harms var. *pereirae* (Royle) Harms)), efedrinijev klorid in rezorcinol. Benzokain lajša bolečino in blaži srbenje na mestu nanosa. Bizmutov subgalat, cinkov oksid, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice, perujski balzam in rezorcinol delujejo protimikrobno, protivnetno in adstringentno. Efedrinijev klorid krči žile in zmanjšuje krvavenje.

Mazilo proti hemoroidom se uporablja za zdravljenje zunanjih hemoroidov, ekcema in srbečice okoli zadnjika.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo proti hemoroidom

Ne uporabljajte zdravila Mazilo proti hemoroidom

- če ste alergični na benzokain, bizmutov subgalat, cinkov oksid, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice, druge rastline iz družine nebinovk (Asteraceae), perujski balzam, efedrinijev klorid, rezorcinol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate nestabilno angino pectoris (bolečino v prsnem košu, ki ni dobro nadzorovana),
- če imate motnje srčnega ritma,
- če imate nenadzorovan visok krvni tlak,
- če imate bolezen koronarnih arterij,
- če imate porfirijo (motnjo v presnovi porfirina),
- če imate odpoved ledvic,
- če imate glavkom zaprtega zakotja.

Zdravila Mazilo proti hemoroidom ne smete uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Obvestila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Mazilo proti hemoroidom se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Druga zdravila in zdravilo Mazilo proti hemoroidom

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Še posebej je pomembno, da opozorite zdravnika ali farmacevta, če jemljete:

- zdravila za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka (kardiotonične glikozide, gvanetidin, propranolol),
- zdravila za zdravljenje depresije (triciklične antidepresive, zaviralce MAO),
- cimetidin (zdravilo za zdravljenje razjed v prebavilih).

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Varnost med nosečnostjo in dojenjem ni bila ugotovljena. Ker ni zadostnih podatkov, uporaba zdravila Mazilo proti hemoroidom med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva. Podatki o vplivu na plodnost niso na voljo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Mazilo proti hemoroidom vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Študij niso izvedli.

Zdravilo Mazilo proti hemoroidom vsebuje lanolin, etanol in perujski balzam

To zdravilo vsebuje lanolin. Lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

To zdravilo vsebuje 23 mg alkohola (etanola) v 1 g. Lahko povzroči pekoč občutek na poškodovani koži.

To zdravilo vsebuje perujski balzam. Lahko povzroči kožne reakcije.

3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo proti hemoroidom

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo Mazilo proti hemoroidom nanosite na prizadeti predel 1- do 2-krat na dan v tankem sloju.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Zdravila Mazilo proti hemoroidom ne smete uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po uporabi zdravila Mazilo proti hemoroidom se lahko pojavijo alergijske reakcije, otekanje in zelo redko huda alergijska reakcija.

V primeru preobčutljivosti na efedrin se lahko pojavijo tesnoba, nespečnost, omotica, visok krvni tlak, hitro in neredno utripanje srca, slabost in bruhanje (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Mazilo proti hemoroidom

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte v zaprti tubi, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninii poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Mazilo proti hemoroidom

Učinkovine so benzokain, bizmutov subgalat, cinkov oksid, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice (*Chamomilla recutita* (L.) Rausch.) ((1 : 1), ekstrakcijsko topilo 10-odstotna (m/m) raztopina amoniaka : voda : 96-odstotni (V/V) etanol (2,5 : 47,5 : 50)), perujski balzam (balzam iz debel perujskega balzamovca (*Myroxylon balsamum* (L.) Harms var. *pereirae* (Royle) Harms)), efedrinijev klorid in rezorcinol. 1 g rektalnega mazila vsebuje 100 mg benzokaina, 50 mg bizmutovega subgalata, 50 mg cinkovega oksida, 50 mg tekočega izvlečka iz cvetov prave kamilice (kar ustreza 50 mg cvetov), 50 mg perujskega balzama, 6 mg efedrinijevega klorida in 3 mg rezorcinola.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so beli vazelin, lanolin (E913), ricinusovo olje, prečiščena voda, etanol in amoniak.

Izgled zdravila Mazilo proti hemoroidom in vsebina pakiranja

Rektalno mazilo je rjave barve in značilnega vonja po perujskem balzamu. Škatla vsebuje aluminijasto tubo s 25 g rektalnega mazila.

Način in režim izdaje zdravila Mazilo proti hemoroidom

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Proizvajalec

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 11. 2025