

Mazilo za rane

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 do 5 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Mazilo za rane in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo za rane
3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo za rane
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Mazilo za rane
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Mazilo za rane in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Mazilo za rane vsebuje bizmutov subgalat, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice (*Chamomilla recutita* (L.) Rausch.), perujski balzam (balzam iz debel perujskega balzamovca (*Myroxylon balsamum* (L.) Harms var. *pereirae* (Royle) Harms)) in ihtiol, ki imajo blago protimikrobno, protivnetno in adstringentno delovanje.

Mazilo za rane se uporablja za celjenje manjših odrgnin, vnetnih poškodb in površinskih ran.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 do 5 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo za rane

Ne uporabljajte zdravila Mazilo za rane

- če ste alergični na bizmutov subgalat, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice, druge rastline iz družine nebinovk (Asteraceae), perujski balzam, ihtiol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- na odprtih ranah in sluznicah.

Obvestila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Mazilo za rane se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Druga zdravila in zdravilo Mazilo za rane

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni znano, da bi zdravilo Mazilo za rane vplivalo na učinke drugih zdravil. Študij o medsebojnem delovanju z zdravili niso izvedli.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Varnost med nosečnostjo in dojenjem ni bila ugotovljena. Ker ni zadostnih podatkov, se pred uporabo zdravila Mazilo za rane med nosečnostjo in dojenjem posvetujte z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Mazilo za rane vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Študij niso izvedli.

Zdravilo Mazilo za rane vsebuje lanolin, etanol in perujski balzam

To zdravilo vsebuje lanolin. Lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

To zdravilo vsebuje 9 mg alkohola (etanola) v 1 g. Lahko povzroči pekoč občutek na poškodovani koži.

To zdravilo vsebuje perujski balzam. Lahko povzroči kožne reakcije.

3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo za rane

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo Mazilo za rane nanesite na prizadete dele kože 1- do 2-krat na dan v tankem sloju.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po uporabi zdravila Mazilo za rane se lahko pojavijo alergijske reakcije na koži, kot so dermatitis, pekoč občutek na koži, rdečina, draženje in srbenje kože (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Mazilo za rane

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte v zaprti tubi, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Mazilo za rane

Učinkovine so bizmutov subgalat, tekoči izvleček iz cvetov prave kamilice (*Chamomilla recutita* (L.) Rausch.) ((1 : 1), ekstrakcijsko topilo 10-odstotna (m/m) raztopina amoniaka : voda : 96-odstotni (V/V) etanol (2,5 : 47,5 : 50)), perujski balzam (balzam iz debel perujskega balzamovca (*Myroxylon balsamum* (L.) Harms var. *pereirae* (Royle) Harms)) in ihtiol. 1 g mazila vsebuje 20 mg bizmutovega subgalata, 20 mg tekočega izvlečka iz cvetov prave kamilice (kar ustreza 20 mg cvetov), 10 mg perujskega balzama in 5 mg ihtiola.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so beli vazelin, lanolin (E913), prečiščena voda, etanol in amoniak.

Izgled zdravila Mazilo za rane in vsebina pakiranja

Mazilo je rumenozelene barve in značilnega vonja po perujskem balzamu in ihtiolu.

Škatla vsebuje aluminijasto tubo s 25 g mazila.

Način in režim izdaje zdravila Mazilo za rane

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Proizvajalec

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 1. 7. 2025