

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za uporabnika. Medicinski pripomoček je na voljo brez recepta. Da vam bo kar najbolje koristil, ga uporabljajte pri navedenih indikacijah.

- Navodilo shranite. Morda ga boste že leli ponovno prebrati.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če so po določenem času simptomi še pojavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu: sadrži važne podatke za korisnika. Ovo je medicinski proizvod dostupan bez liječničkog recepta. Međutim, u svrhu postizanja bolje djelotvornosti, potrebno ga je koristiti prema opisanim indikacijama.

- Sačuvajte ovu uputu za upotrebu, možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Za dodatne informacije ili savjet, obratite se svom liječniku i/ili ljekarniku.
- Ako se nakon određenog vremena simptomi nastave, obratite se svom liječniku.

# MICOVAG PLUS®

## vaginalne globule | vagitoriji

### SESTAVA

Polsintetični gliceridi, borova kislina, silikatni dimetil sililat, bisabolol, vitamin E acetat, mlečna kislina.

### V KAKŠNI OBЛИKI JE

Vaginalne globule MICOVAG PLUS so globule za vaginalno uporabo. V škatli je 10 vaginalnih globul po 2 g.

### KAJ JE IN KAKO SE UPORABLJA

Kandidoza je vaginalna okužba, ki jo povzročajo glivice iz rodu Candida (najpogosteje vrsta Candida albicans). Glivice iz rodu Candida so normalno prisotne v vaginalni flori in so v ravnovesju z drugimi mikrobi. V posebnih stanjih (zmanjšana odpornost, antibiotična in kortikosteroidna terapija, pomanjkanje vitaminov, prehrana, bogata s sladkorji in ogljikovimi hidrati, stres, uporaba kontracepcijskih tablet, nošenje ozkega ali sintetičnega spodnjega perila) se lahko glivice iz rodu Candida močno namnožijo in porušijo ravnovesje med mikrobi vaginalne flore ter povzročijo nastanek vulvovaginalne kandidoze. Za obvladovanje kandidoze je pomembna ponovna vzpostavitev fiziološkega pH nožnice. Ta pripomore k ravnovesju vaginalne flore in ustvari neprijazno okolje za rast in razvoj glivic.

### INDIKACIJE

Vaginalne globule MICOVAG PLUS so namenjene dopolnilnemu zdravljenju vaginalnih glivičnih vnetij. Delujejo tako, da ponovno vzpostavijo fiziološki pH nožnice, kar pripomore k preprečevanju kolonizacije patogenih mikrobov. Poleg tega delujejo pomirjujoče in posledično odpravljajo moteče srbenje in pekoč občutek.

### KDAJ GA NE SMETE UPORABLJATI

Ne uporabljajte v primeru individualne preobčutljivosti za katerokoli sestavino izdelka.

#### Nosečnost in dojenje

V teh primerih je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

#### Vpliv na upravljanje vozil in strojev

Posebni varnostni ukrepi niso potrebni.

### SASTAV

Polusintetski gliceridi, borna kiselina, silicijev dioksid dimetil sililat, bisabolol, vitamin E acetat, mliječna kislina.

### U KOJEM JE OBЛИKU

MICOVAG PLUS vagitorij je oblik za primjenu u rodnici. Pakovanje sadrži 10 vagitorija od 2 g.

### ŠTO JE I ZA ŠTO SE KORISTI

Kandidoza je vaginalna infekcija uzrokovana gljivicama roda Candida (najčešće Candida albicans). Candida je normalno prisutna u vaginalnom ekosustavu u ravnoteži s drugim vrstama. U određenim uvjetima (oslabljen imunitet, liječenje antibioticima i kortizonom, nedostatak vitamina i/ili prehrana bogata šećerima i ugljikohidratima, stres, primjena oralnih kontraceptiva, preusko i/ili sintetičko donje rublje), ove se glivice roda Candida prekomjerno razmnožavaju mijenjajući time ravnotežu među vrstama vaginalne flore i uzrokujući razvoj vaginalne kandidoze. U svrhu liječenja kandidoze, korisno je obnoviti ravnotežu među vrstama na način da se vaginalni pH vrati na optimalnu vrijednost, čime se stvara nepodobno okruženje za rast glivice.

### INDIKACIJE

MICOVAG PLUS vagitoriji se primjenjuju kao dodatna terapija kod liječenja vaginalnih mikoza. Proizvod djeluje na rebalans i normalizaciju vaginalnog pH što je korisno protiv naseljavanja patogena. Dodatno, zahvaljujući učinku vlaženja, ublažava neugodan svrbež i osjećaj peckanja.

### KADA SE NE SMIJE KORISTITI

Ne koristite u slučaju individualne preosjetljivosti na jednu od komponenata proizvoda.

#### Trudnoća i dojenje

U ovim slučajevima, potrebno je posavjetovati se s liječnikom.

#### Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima


Nisu potrebne posebne mjere predostrožnosti.

## MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI IZDELKI

Medsebojna delovanja z drugimi izdelki niso znana, zato je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, preden uporabite vaginalne globule MICOVAG PLUS v kombinaciji z drugimi medicinskim pripomočki ali zdravili za vaginalno uporabo.

## KAKO SE UPORABLJA

Razmaknite in potegnite narazen oba konca folije na vrhu ovoja, vzemite globulo iz ovoja in jo vstavite globoko v nožnico. Pred uporabo medicinskega pripomočka in po njem si umijte roke.



## KDAJ IN KAKO DOLGO

Vstavite eno globulo, najbolje zvečer pred spanjem ali po navodilu zdravnika.

## NEŽELENI UČINKI

Uporaba kateregakoli izdelka za lokalno uporabo, posebno dolgotrajna, lahko povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom o ustrezni terapiji. Če se pojavijo drugi neželeni učinki, o tem obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

## OPOZORILA

Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Ne zaužijte izdelka.

## ROK UPORABE, SHRANJEVANJE IN ODSTRANEVANJE

Rok uporabe se nanaša na zaprt in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporablajte po izteku roka uporabe oziroma če je embalaža odprta ali poškodovana. Medicinski pripomoček shranjujte zaščiten pred svetlobo in toploto, najbolje pri temperaturi od 4°C do 25°C. Medicinskih pripomočkov naj ne bi odvrgli v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja medicinskih pripomočkov, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte s svojim farmacevtom. To bo pripomoglo k zaščiti okolja.

## INTERAKCIJE S DRUGIM PROIZVODIMA

Interakcije s drugim proizvodima nisu poznate zbog čega se preporuča konzultirati se s liječnikom prije primjene MICOVAG PLUS vagitorija u kombinaciji s drugim medicinskim proizvodima ili lijekovima za primjenu u rodnicu.

## KAKO GA KORISTITI

Izvadite vagitorij povlačenjem dva krilca blistera i umetnite ga duboko u rodnicu. Operite ruke prije i poslije upotrebe medicinskog proizvoda.

## KADA I KOLIKO DUGO

Koristite jedan vagitorij na dan, poželjno ga je staviti uvečer prije spavanja ili prema liječničkoj uputi.

## ŠTETNI DOGAĐAJI

Uporaba svih preparata za topikalnu primjenu, posebno tijekom duljeg vremenskog razdoblja, može uzrokovati osjetljivost. Ako se ovo dogodi, prekinite liječnje i posavjetujte se s liječnikom o primjerenoj terapiji. Ako se pojave drugi štetni događaji, obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

## UPOZORENJA

Čuvajte izvan dohvata djece. Izbjegavajte doticaj s očima. Ne gutajte.

## ROK VALJANOSTI, ČUVANJE I ZBRINJAVANJE

Rok valjanosti se odnosi na proizvod u neotvorenem i pravilno čuvanom pakovanju. Ne koristite ga nakon isteka roka valjanosti ili ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno. Čuvajte medicinski proizvod dalje od svjetla i topline, poželjno čuvati na temperaturi između 4°C i 25°C. Medicinski proizvodi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad; pitajte svog ljekarnika kako zbrinuti medicinske proizvode koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK | MEDICINSKI PROIZVOD C € 0373

FARMA-DERMA s.r.l. – Via dei Bersaglieri 10 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIJA (ITALY)

Distributer / Distributer:  
DR. GORKIĆ d.o.o. – Obrtniška ulica 11 – 1370 LOGATEC – SLOVENIJA