



NAVODILO ZA UPORABO

Borvazelin

borova kislina

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v nekaj dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če kateri koli neželeni učinek postane resen ali če opazite kateri koli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

- Kaj je zdravilo Borvazelin in za kaj ga uporabljamo
- Kaj morate vedeti preden boste uporabili zdravilo Borvazelin
- Kako uporabljati zdravilo Borvazelin
- Možni neželeni učinki
- Shranjevanje zdravila Borvazelin
- Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO BORVAZELIN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Borvazelin vsebuje borovo kislino, ki učinkuje na kožna glivična obolenja in ima obenem blago protibakterijsko delovanje.

Borvazelin se uporablja za zaščito suhe kože ter zdravljenje blažjih oblik ekcemov in blažjih vnetij kože.

2. KAJ MORATE VEDETI PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO BORVAZELIN

Ne uporabljajte zdravila Borvazelin:

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ali katero koli sestavino zdravila,
- na ranah, sluznicah in večjih površinah poškodovane kože,
- pri dojenčkih in otrocih do 3. leta starosti.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Borvazelin ne sme priti v stik s sluznicami in očmi.

Izogibajte se uporabi na velikih površinah kože.

Če se vam stanje v nekaj dneh ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom!

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katero koli zdravilo.





3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILNO BORVAZELIN

Odmerjanje in način uporabe

Mazilo namažite na kožo v tankem sloju večkrat na dan.

Prekomerno odmerjanje

Pri dolgotrajni uporabi na velikih površinah kože ali na poškodovani koži in ranah lahko pride do kronične zastrupitve z borovo kislino.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Borvazelin neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V redkih primerih lahko Borvazelin povzroči alergične reakcije (močna, dražeča pordelost kože, izpuščaji, srbenje...). V takih primerih zdravilo prenehajte uporabljati in se posvetujte s farmacevtom ali z zdravnikom.

Če kateri koli neželeni učinek postane resen ali če opazite kateri koli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA BORVAZELIN

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Trubo shranjujte tesno zaprto, pri temperaturi do 25 °C, zaščiten pred svetlobo.

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Borvazelin

Zdravilna učinkovina je borova kislina.

Pomožna snov je beli vazelin.

1 g mazila vsebuje 30 mg borove kisline (Acidum boricum).

Izgled zdravila Borvazelin in vsebina pakiranja

Borvazelin je bele barve.

V škatli je tuba s 25 g mazila.

Način izdaje zdravila Borvazelin

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Ime in naslov izdelovalca

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila: 5. 2. 2015

