

OROXID® forte — raztopina v pršilu (100 ml) ali ustna voda (250 ml)

1. Opis izdelka in namen uporabe

OROXID® forte je raztopina, ki vsebuje 3 % vodikovega peroksida in se uporablja za vzdrževanje ustne higiene in zdravih dlesni ter kot pomoč pri vnetnih stanjih v ustni votlini.

Namenjena je preprečevanju in lažšanju boleznih obzobnih tkiv, kot so npr. razdražene, krvaveče in vnete dlesni. Pomaga pri lažšanju gingivitisa, parodontitisa, poškodb dlesni zaradi posegov, kot je na primer puljenje zob. Za preprečevanje gingivitisa in drugih vnetnih boleznih v ustni votlini je nujno potrebna ustrezna ustna higiena. Razvoj gingivitisa je pogojen s prisotnostjo zobnih oblog in bakterij.

OROXID® forte, zaradi svojih mehaničnih lastnosti in sproščanja kisika v obliki blagega penjenja vodikov peroksid vpliva na mikrookolje poškodovane sluznice. Zato ga priporočamo kot dopolnitveno ustno higieno pri fiksni zobni aparaturi, delnih protezah, fiksni protetični nadomestki (prevleke, mostički) in zobnih vsadkih. Izboljšuje rezultate ustne higiene pri pacientih z ortodontskimi nepravilnostmi, ki otežujejo običajno zobno higieno. Vodikov peroksid lahko pomaga pri preprečevanju nastanka zobnih oblog, obarvanosti zob in zadaha. Pomaga tudi pri zmanjševanju oblog na jeziku in ustni sluznici, običajno pogojenih s prisotnostjo glivnih povzročiteljev ter odstranjuje zadah. Delovanje je izraženo le na površini, saj vodikov peroksid ne prehaja v globlja tkiva.

OROXID® forte vsebuje kot pomožno snov Actipone® PX3 – izvleček zelišč.

Izdelek je na voljo v obliki pršila v pakiranju po 100 ml in raztopine za grgranje po 250 ml.

2. Način uporabe

OROXID® forte se uporablja dva- do trikrat na dan, najbolje med ali po opravljenem ščetkanju zob.

OROXID® forte sprej: razpšite raztopino v ustno votlino s 3 do 4 pritiski na pršilo, jo grgrajte približno 30 sekund in izpljunite.

OROXID® forte ustna voda: Približno 20 ml tekočine (vsebino dveh zamaškov) nalijte v kozarec, jo grgrajte približno 30 sekund in izpljunite.

OROXID® forte uporabljajte redno vse do izboljšanja stanja oziroma odstranitve vnetja, največ 8 tednov. Če se stanje ne izboljša, se posvetujte z zdravnikom. Izdelek **OROXID® forte** ni namenjen za zdravljenje hujših vnetnih boleznih ustne votline, ki zajemajo tudi globlja tkiva; v tem primeru obiščite zdravnika. Za preventivne namene in vzdrževanje dobre higiene ustne votline, uporabljajte izdelek **OROXID® forte** enkrat na dan na način, kot je opisan zgoraj. Ob vnosu raztopine v usta se lahko pojavi občutek penjenja, kar kaže na sproščanje aktivnega kisika.

3. Neželene učinki in previdnostni ukrepi

Pri uporabi na sluznici lahko vodikov peroksid v nizki koncentraciji redko povzroči občutek draženja. V primeru preobčutljivostne reakcije ali draženja izdelek **OROXID® forte** prenehajte uporabljati. Občutek draženja je prehodne narave, ki po nekaj minutah ali po spiranju z vodo preneha. Izdelek **OROXID® forte** je namenjen le za lokalno uporabo v ustni votlini in grgranje. Izdelek ni namenjen uživanju in ga po opravljenem grgranju izpljunite. Izogibajte se stiku z očmi.

Stik z očmi

Stik izdelka **OROXID® forte** z očesom lahko povzroči draženje, solzenje in zamegljen vid, vendar so hujše poškodbe malo verjetne. Ob stiku raztopine z očmi je treba prizadeto oko izpirati s tekočo vodo ali fiziološko raztopino ter po potrebi obiskati zdravnika.

Zaužitje

Ob zaužitju lahko izdelek **OROXID® forte** povzroči blago draženje sluznice prebavil, bruhanje in drisko. Ob zaužitju večje količine raztopine ter ob pojavu hujših simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Vdihavanje

Izdelek **OROXID® forte** pri sobni temperaturi ne tvori znatnih količin hlapov vodikovega peroksida. Pri segrevanju ali razpršitvi raztopine lahko pride do akutnega vdihavanja vodikovega peroksida, ki lahko povzroči draženje v nosu, žrelu in dihalih.

Razlitje

Vsebnika ne odpirajte, da se vsebina ne razlije. Če pride do razlitja in raztopina pride v stik s kožo, prizadeto mesto sperite z obilico vode. Razlito raztopino s predmetov pobrišite z dovoljšno količino papirja in si nato umijte roke.

4. Sestavine

Izdelek **OROXID® forte** vsebuje deionizirano vodo, 3-odstotno raztopino vodikovega peroksida, Actipone® PX3 (Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Zingiber Officinale Root Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, Echinacea Purpurea Extract Purpurea Extract), arome in stabilizator.

5. Shranjevanje, rok uporabe

Raztopino **OROXID® forte** hranite pri sobni temperaturi od 5 °C do 25 °C.

Rok uporabe izdelka je dve leti. Izdelka ne uporabljajte po preteku roka uporabe.

Po odprtju oziroma aktivaciji pršilke je izdelek priporočljivo porabiti v treh mesecih.

Shranjujte zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Uporabljajte le izdelek v nepoškodovanem vsebniku. Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Proizvajalec:










ENIKAM d.o.o.
C. Andreja Bitenca 118
1000 Ljubljana, Slovenia
info@enikam.com
Tel.: +386 31 634 900
www.oxid.com

Datum zadnje revizije besedila: 10/2016 - V1.2
Razvrstitev medicinskega pripomočka: razred II a
Številka CE-certifikata: CE 1304



Opis simbolov na ovojnini:

-  Številka serije
-  Referenčna številka
-  Upoštevajte navodila za uporabo
-  Uporabno do: mesec in leto
-  Shranjevanje (temperatura)
-  Zaščitite pred sončno svetlobo
-  Proizvajalec