

## **NOACID PERORALNA SUSPENZIJA 200ML**

### **Noacid peroralna suspenzija je medicinski pripomoček razreda IIa**

#### **TAKOJŠEN UČINEK - AKTIVNE NARAVNE UČINKOVINE**

- Zaščiti želodčno sluznico in sluznico požiralnika
- Zmanjša pekoč občutek
- Nevtralizira želodčno kislino
- Zavira refluks
- Ščiti želodec

**Noacid peroralna suspenzija** je medicinski pripomoček z mehanskim delovanjem. Uporablja se za nevtralizacijo občutka povečane kislosti, pekočega občutka in bolečine v želodcu, ki nastanejo zaradi razdražene želodčne sluznice. Namenjen je odpravljanju gastroezofagealnega refluksa, saj zmanjša simptome kot so kisli refluks, zgaga, refluks želodčne vsebine zaradi slabe prebave, refluksni ezofagitis, kašelj, hripavost in zmanjšuje težave katerih glavni ali stranski vzrok je želodčni refluks.

Zaradi vzajemnega delovanja sestavin, ki tvorijo aktivno zaščito želodčne sluznice in sluznice požiralnika, Noacid peroralna suspenzija deluje kot lokalna mehanska zaščita. Ta dopolnjuje fiziološko zaščito gastroezofagealne sluznice, hitro nevtralizira pekoč občutek, bolečino ter občutek težine.

Noacid peroralna suspenzija pripomore k preprečevanju razdraženosti želodca, ki je posledica psihofizičnega stresa, menjave letnih časov, neustreznega življenjskega sloga, jemanja nesteroidnih protivnetnih zdravil, protibolečinskih sredstev in snovi, ki povzročajo razdražljivost.

**SESTAVINE:** demineralizirana voda; sredstvo za zgoščevanje: alginska kislina; suhi izvleček sladkega korena (Glycyrrhiza glabra, maltodekstrin); suhi izvleček sleza (Althaea officinalis, maltodekstrin); suhi izvleček slezenovca (Malva sylvestris, maltodekstrin); suhi izvleček koncentriranega gela aloje 200:1 (Aloe barbadensis); suhi izvleček kamilice (Matricaria chamomilla, maltodekstrin); konzervansi: kalijev sorbat; stabilizator: gumi arabika; aroma; sladilo: sukraloza.

**NAVODILA ZA UPORABO:** pred uporabo pretresite, saj izdelek lahko vsebuje usedlino. Morebitne spremembe v barvi in okusu so posledica naravnega izvora izvlečkov in le-te ne vplivajo na kakovost in učinkovitost izdelka. Priporoča se zaužijte 40 do 60 ml dnevno (dve do tri merice po 20 ml), uro do dve pred ali po jedi. Ponovno zaužijte po potrebi, lahko tudi večkrat na dan.

**OPOZORILA:** izdelka naj ne uživajo osebe, ki so preobčutljive ali alergične na eno ali več sestavin. V primeru, da simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Hraniti v hladnem in suhem prostoru, oddaljeno od toplotnih in svetlobnih virov. Hraniti nedosegljivo otrokom! Številka lota in datum uporabe sta odtisnjena na dnu ovojnine. Rok uporabe se nanaša na pravilno shranjen izdelek v nepoškodovani embalaži. Ne uporabljajte z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili, ne da bi se predhodno posvetovali z zdravnikom. Ker je na voljo premalo znanstvenih podatkov, ki bi podpirali uporabo Noacida v nosečnosti, je priporočljivo, da se pred uporabo medicinskega pripomočka posvetujete z zdravnikom.

**STRANSKI UČINKI:** Noacid peroralno suspenzijo uporabniki dobro prenašajo, stranski učinki niso znani. V primeru prevelikega odmerjanja se lahko pojavi driska.

**Embalaža:** PET plastenka, vsebine 200 ml. Izdelek je na voljo tudi v orodisperzibilnih (topnih v ustih) tabletah.

**Proizvajalec in poreklo:** Pharmalife Research srl – Via alla Spiaggia 7/A – 23900 Lecco - Italija

**Zastopnik:** Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r, 6310 Izola, [www.sanofarm.si](http://www.sanofarm.si)