

## Navodilo za uporabo

### Strepsils brez sladkorja z okusom limone 0,6 mg/1,2 mg pastile amilmetakrezol/2,4-diklorobenzilalkohol

#### **Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.

#### **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone
3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### **1. Kaj je zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone in za kaj ga uporabljamo**

Amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol imata antiseptične lastnosti.

Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone je namenjeno za ublažitev simptomov vnetja žrela in okužb v ustih in žrelu.

#### **2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone**

##### **Ne uporabljajte zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone**

- če ste alergični na amilmetakrezol ali 2,4-diklorobenzilalkohol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- pri otrocih, mlajših od 6 let.

##### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom uporabe zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če že dlje časa kašljate ali če ste hripavi, se posvetujte z zdravnikom.

Priporočenih odmerkov zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone ne smete preseči. Uporabite najmanjši učinkovit odmerek za najkrajše možno trajanje zdravljenja.

Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

##### **Druga zdravila in zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone**

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

## **Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone skupaj s hrano in pijačo**

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na učinke zdravila.

### **Nosečnost, dojenje in plodnost**

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ker ni dovolj podatkov o varnosti zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva.

Podatki o vplivu zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone na plodnost niso na voljo.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

**Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone vsebuje tekoči maltitol in izomalt**, ki imata lahko blag odvajalni učinek. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

## **3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je:

Odrasli: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 12 pastil.

### **Uporaba pri otrocih in mladostnikih**

Otroci, starejši od 6 let, in mladostniki: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil.

**Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let.**

Starostniki: posebno prilagajanje odmerka ni potrebno.

Neposredno po uporabi zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### **Če ste uporabili večji odmerek zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone, kot bi smeli**

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Preveliko odmerjanje lahko povzroči želodčne in črevesne težave.

### **Če ste pozabili uporabiti zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone**

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## **4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Spodnji seznam neželenih učinkov se nanaša na kratkotrajno uporabo zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone. V primeru dolgotrajnega zdravljenja kroničnih težav se lahko pojavijo dodatni neželeni učinki.

Možni neželeni učinki, ki se lahko pojavijo:

**Občasni** (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- preobčutljivost, otekanje ust in žrela, draženje žrela, mravljinčenje v ustih, neprijeten občutek v ustih, izpuščaji

**Redki** (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- pekoča bolečina v jeziku

**Zelo redki** (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- prebavne motnje, slabost

**Neznana pogostnost** (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov):

- bolečina v trebuhu

### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)

spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si).

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## **5. Shranjevanje zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake "Uporabno do:". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## **6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

### **Kaj vsebuje zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone**

- Zdravilni učinkovini sta amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol. Ena pastila vsebuje 0,6 mg amilmetakrezola in 1,2 mg 2,4-diklorobenzilalkohola.
- Druge sestavine zdravila so: aroma limone, natrijev saharinat, vinska kislina, izomalt (E953), tekoči maltitol.

**Izgled zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom limone in vsebina pakiranja**

Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom limone je na voljo v obliki belih do blede rumenih, okroglih pastil s Strepsils "S" zaščitnim znakom na obeh straneh.

Na voljo je v kartonski škatli s 16 ali 24 pastilami (2 x 8 pastil ali 2 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije).

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

**Način izdajanja zdravila**

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

**Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec****Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Velika Britanija

**Izdelovalec**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na podjetje PharmaSwiss d.o.o, Brodišče 32, 1236 Trzin, ki je odgovorno za trženje zdravila v Sloveniji.

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 18.8.2017**