

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za uporabnike. Medicinski pripomoček je na voljo brez recepta. Da vam bo kar najbolje koristil, ga uporabljajte pri navedenih indikacijah.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se po določenem času simptomi še pojavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

Proktis-M®

NATRIJEVA SOL HIALURONSKE KISLINE, 5 mg
Svečke

SESTAVA

Natrijeva sol hialuronske kisline, 5 mg; oljni izvleček azijskega vodnega popnjaka (*Centela asiatica*); oljni izvleček ognjiča; oljni izvleček aloje vera; eterično olje kajeputa (Tea tree); polsintetični gliceridi; BHT.

V KAKŠNI OBLIKI JE

PROKTIS-M® je svečka za rektalno uporabo. V škatli je 10 svečk po 2 g E.

KAJ JE IN KAKO SE UPORABLJA

Svečke PROKTIS-M® učinkujejo zaradi vsebnosti hialuronske kisline. To je mukopolisaharid, ki je v večjih količinah prisoten v mnogih telesnih tkivih. Hialuronska kislina pripomore k izgrajevanju tkiv tako, da jim povrne čvrstost, prožnost in elastičnost. Številne klinične študije so pokazale, da hialuronska kislina lahko pospeši in izboljša obnovo povrhnjice in celjenje tkiva.

INDIKACIJE

Dodatna pomoč pri obnavljanju analno-rektalnega kanala po proktoloških operacijah; notranjih in zunanjih hemoroidih; proktitisu; kriptitisu; analnih ragadah; fisurah; perianalnih fistulah.

KDAJ NAJ GA NE BI UPORABLJALI

V primeru individualne preobčutljivosti za katerokoli sestavino.

Nosečnost in dojenje

Varnost uporabe svečk PROKTIS-M® med nosečnostjo in dojenjem ni znana. V teh primerih je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Vpliv na upravljanje vozil in strojev


Posebni varnostni ukrepi niso potrebni.

MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI IZDELKI

Medsebojna delovanja z drugimi izdelki niso znana, zato je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, preden uporabite svečke PROKTIS-M® v kombinaciji z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili za rektalno uporabo.

KAKO SE UPORABLJA

Odstranite svečko tako, da razmaknete in potegnete narazen oba konca folije na vrhu ovoja. V skladu z dobro higiensko prakso si umijte roke pred uporabo medicinskega pripomočka in po njej.



KDAJ IN KAKO DOLGO

Uporabite eno svečko zvečer ali po navodilu zdravnika. Trajanje uporabe je odvisno od razvoja simptomov; če je potrebno, so svečke PROKTIS-M® primerne tudi za dolgotrajno uporabo.

NEŽELENI UČINKI

Uporaba kateregakoli izdelka za lokalno uporabo, posebno dolgotrajna, lahko povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom o ustreznri terapiji. Če se pojavijo neželeni učinki, ki niso opisani v teh navodilih, obvestite o tem svojega zdravnika ali farmacevta.

OPOZORILA

Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Ne zaužijte izdelka.

ROK UPORABE IN SHRANJEVANJE

Rok uporabe je naveden na embalaži (EXP) in se nanaša na zaprt in pravilno hranjen izdelek. Svečk ne uporabljajte po izteku roka uporabe, navedenega na embalaži, oziroma če je embalaža odprta ali poškodovana. Medicinski pripomoček shranjujte tesno zaprt, zaščiten pred svetlobo in toploto, najbolje pri temperaturi od 4 do 25 °C.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK C E 0373

 Proizvajalec: FARMA-DERMA s.r.l.
Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO) ITALIJA (ITALY)

Uvoznič:
DR. GORKIĆ d.o.o.
Obretniška 11, 1370 LOGATEC, SLOVENIJA