

Navodilo za uporabo

Recreol 50 mg/g mazilo dekspantenol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 14 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Recreol mazilo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Recreol mazilo
3. Kako uporabljati zdravilo Recreol mazilo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Recreol mazilo
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Recreol mazilo in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Recreol mazilo vsebuje učinkovino dekspantenol, ki spada v skupino pripravkov za zdravljenje ran in razjed. Dekspantenol se v tkivih pretvori v pantotensko kislino. Pantotenska kislina povrne elastičnost kože in pospešuje celjenje ran.

Zdravilo Recreol mazilo se uporablja za:

- podporno zdravljenje površinskih kožnih poškodb različnega izvora. Pomaga vlažiti zunanjo plast kože in podpira celjenje z naknadnimi protivnetnimi učinki in učinki proti srbenju.

Recreol mazilo se lahko uporablja pri otrocih, mladostnikih in odraslih.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Recreol mazilo

Ne uporabljajte zdravila Recreol mazilo:

- če ste alergični na dekspantenol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- na ranah, če imate hemofilijo, zaradi nevarnosti močne krvavitve.

Opozorila in previdnostni ukrepi

V primeru alergijske reakcije je treba uporabo zdravila Recreol mazilo prekiniti.

Zdravilo ne sme priti v stik z očmi.

Če se zdravilo Recreol mazilo uporablja okoli anogenitalne regije, lahko to vpliva na trdnost sten kondomov.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Recreol

Med uporabo zdravila Recreol ne kadite in se ne približujte odprtemu ognju zaradi nevarnosti hudih opeklin. Tkanina (oblačila, posteljnina, obleke itd.), ki je bila v stiku s tem zdravilom, lažje gori in

predstavlja resno požarno nevarnost. Pranje oblačil in posteljnine lahko zmanjša nalaganje ostankov izdelka, vendar ga ne odstrani popolnoma.

Druga zdravila in zdravilo Recreol mazilo

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni poznano.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Zdravilo Recreol mazilo lahko uporabljate med nosečnostjo in dojenjem le, če to priporoči zdravnik. Med dojenjem se je treba izogibati lokalni uporabi na dojkah, da se prepreči ustni stik otroka z zdravilom.

Študij o vplivu na plodnost pri ljudeh z dekspantenolom niso izvedli.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Recreol mazilo nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

Zdravilo Recreol mazilo vsebuje cetilalkohol, stearilalkohol in lanolin

Cetilalkohol, stearilalkohol in lanolin lahko povzročijo lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako uporabljati zdravilo Recreol mazilo

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Za dermalno uporabo.

Če ni drugače predpisano, se pri odraslih in otrocih nanese zdravilo Recreol mazilo na prizadeto območje v tankem sloju enkrat ali večkrat na dan, po potrebi.

Trajanje zdravljenja je odvisno od narave in poteka bolezni. Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 14 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Uporaba pri otrocih

Recreol mazilo se lahko uporablja pri otrocih.

Če menite, da je učinek mazila Recreol premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov): alergijske reakcije, preobčutljivostne reakcije (npr. vnetje kože/alergijske in dražeče kožne reakcije).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Recreol mazilo

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C!

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake "EXP". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Recreol mazilo

- Učinkovina je dekspantenol. 1 g mazila vsebuje 50 mg dekspantenola.
- Druge sestavine zdravila so: stearilalkohol, cetilalkohol, beli vosek, protegin XN (tekoči parafin, vazelin, ozokerit, glicerilmonooleat, lanolinski alkoholi), rafinirano mandljevo olje, beli vazelin, tekoči parafin, lanolin, prečiščena voda.

Izgled zdravila Recreol mazilo in vsebina pakiranja

Homogeno, gladko mazilo rahlo rumenkaste barve s specifičnim vonjem.

Na voljo sta 30 g in 50 g pakiranja v aluminijasti tubi. Tuba je zaprta s aluminijasto folijo in opremljena z belim navojnim pokrovčkom. Aluminijasta tuba je v kartonski škatli.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Recreol mazilo

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

AS GRINDEKS
Krustpils iela 53,
Rīga, LV-1057,
Latvija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Estonija RECREOL
JAZMP-R/001-9.12.2021

Latvija	RECREOL 50 mg/g ziede
Litva	RECREOL 50 mg/g tepalas
Češka	RECREOL
Slovaška	RECREOL 50 mg/g mast'
Madžarska	RECREOL 50 mg/g kenőcs
Finska	Recreol 50 mg/g voide
Poljska	Recreol
Romunija	Recreol 50 mg/g unguent
Portugalska	Recreol 50 mg/g pomada
Slovenija	Recreol 50 mg/g mazilo
Avstrija	Recreol 50 mg/g Salbe
Nemčija	Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Salbe

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 9. 12. 2021