

Tablete proti bolečinam 250 mg/150 mg/50 mg paracetamol/propifenazon/kofein

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh v primeru lajšanja bolečin oziroma 3 dneh v primeru zniževanja povišane telesne temperature, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Tablete proti bolečinam in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Tablete proti bolečinam
3. Kako uporabljati zdravilo Tablete proti bolečinam
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Tablete proti bolečinam
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Tablete proti bolečinam in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Tablete proti bolečinam vsebuje kombinacijo učinkovin, ki zagotavljajo hitro in učinkovito lajšanje bolečin, blažijo vnetja in znižujejo povišano telesno temperaturo. Paracetamol in propifenazon delujeta protibolečinsko in protivnetno, kofein pa njun učinek, ki nastopi hitro in traja nekaj ur, še povečuje.

Tablete proti bolečinam uporabljamo za:

- lajšanje bolečin, kot so glavobol, zobobol, migrena, menstrualne bolečine, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine po poškodbah in operacijah, nevralgije,
- znižanje povišane telesne temperature pri prehladu in gripi.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh v primeru lajšanja bolečin oziroma 3 dneh v primeru zniževanja povišane telesne temperature, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Tablete proti bolečinam

Ne jemljite zdravila Tablete proti bolečinam

- če ste alergični na paracetamol, propifenazon, kofein ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če ste alergični na salicilate in nesteroidna protivnetna zdravila,
- če imate prirojeno pomanjkanje encima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze, ki povzroča razpad rdečih krvnih celic (hemolitično anemijo),
- če imate dedno bolezen, imenovano akutna intermitentna porfirija (motnja v presnovi porfirina),
- če ste noseči ali dojite.

Tablet proti bolečinam ne smete dajati otrokom, mlajšim od 12 let.

Obvestila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Tablete proti bolečinam se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Tablete proti bolečinam:

- če imate okvaro jeter (npr. bolniki s hepatitisom ali alkoholiki),
- če imate okvaro ledvic,
- če imate dedno bolezen, imenovano Gilbertov sindrom,
- če imate okvaro kostnega mozga,
- če imate astmo, kronični nahod ali koprivnico.

Zdravilo Tablete proti bolečinam ni primerno za dolgotrajno zdravljenje. V redkih primerih lahko dolgotrajna uporaba zdravila trajno poškoduje ledvice in jetra. Dolgotrajno zdravljenje glavobola lahko prav tako privede do kroničnega glavobola.

Tablete proti bolečinam znižujejo telesno temperaturo, zato lahko uporaba zdravila prikrije znake okužbe.

Otroci

Tablet proti bolečinam ne smete dajati otrokom, mlajšim od 12 let.

Druga zdravila in zdravilo Tablete proti bolečinam

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Zdravila Tablete proti bolečinam ne smete jemati sočasno z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol ali propifenazon, ker lahko presežete največji priporočen odmerek.

Učinek zdravila Tablete proti bolečinam in nekaterih naštetih zdravil se zaradi medsebojnega učinkovanja poveča ali zmanjša. Lahko se okrepijo tudi neželeni učinki posameznih zdravil. To se lahko zgodi pri sočasnem jemanju zdravil:

- za zdravljenje tuberkuloze (rifampicin),
- za zdravljenje epilepsije (barbiturati, antiepileptiki),
- za preprečevanje strjevanja krvi (acenokumarol, varfarin),
- za uravnavanje črevesne gibljivosti (metoklopramid),
- za preprečevanje slabosti in bruhanja (domperidon),
- za uravnavanje količine holesterola in drugih maščob v krvi (holestiramin),
- za zdravljenje bakterijskih okužb (kloramfenikol),
- za zdravljenje bolezni v psihiatriji in nevrologiji (litij, zaviralci monoaminoooksidaze)
- za zdravljenje protivirusnih obolenj (zidovudin),
- za zdravljenje srčnega popuščanja (kardiotonični glikozidi),
- za zdravljenje motenj srčnega ritma (prokainamid).

Zdravilo Tablete proti bolečinam skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Zdravilo Tablete proti bolečinam lahko vzamete ne glede na obroke hrane. Med jemanjem zdravila ne uživajte alkohola.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zdravila Tablete proti bolečinam v času nosečnosti in dojenja ne smete uporabljati.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Tablete proti bolečinam ne vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

3. Kako uporabljati zdravilo Tablete proti bolečinam

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravila Tablete proti bolečinam ne smete uporabljati dalj časa ali v odmerkih, ki so večji od priporočenih. Če menite, da je učinek zdravila ob uporabi priporočenih odmerkov premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Priporočeni odmerek za odrasle je 1 do 2 tableti do 3-krat dnevno.

Tablete zaužijte z zadostno količino tekočine.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Mladostniki, starejši od 12 let, naj vzamejo 1 tableto do 3-krat dnevno.

Tablet proti bolečinam ne smete dajati otrokom, mlajšim od 12 let.

Trajanje zdravljenja

Tablet proti bolečinam ne jemljite več kot 7 dni za lajšanje bolečin in ne več kot 3 dni za zniževanje povišane telesne temperature. Po tem času se posvetujte z zdravnikom o nadaljnjem zdravljenju.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Tablete proti bolečinam, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliki odmerki lahko povzročijo slabost, bruhanje, hitro utripanje srca in jetno okvaro, ki je lahko tudi smrtno nevarna.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Tablete proti bolečinam

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih:

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov): alergijske reakcije na koži (srbenje, rdečina, koprivnica), nenaden pojav oteklin (predvsem na obrazu, očeh, v ustih ali žrelu), astma. V zelo redkih primerih so poročali o resnih kožnih reakcijah.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti): takojšnja alergijska reakcija, ki je lahko tudi huda in smrtno nevarna, zmanjšanje števila krvnih ploščic (trombocitopenija), zmanjšanje števila belih krvnih celic (levkocitopenija).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Tablete proti bolečinam

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Tablete proti bolečinam

- Učinkovine so paracetamol, propifenazon in kofeina. Ena tableta vsebuje 250 mg paracetamola, 150 mg propifenazona in 50 mg kofeina.
- Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so koruzni škrob, mikrokristalna celuloza, želatina in magnezijev stearat.

Izgled zdravila Tablete proti bolečinam in vsebina pakiranja

Tablete so bele barve, okrogle, gladke, z ravno površino na obeh straneh.

Škatla vsebuje steklen vsebnik s 15 tabletami. Zaporka vsebnika je iz polipropilena (PP) in polietilena nizke gostote (LDPE).

Način izdaje zdravila Tablete proti bolečinam

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Proizvajalec

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisjska ulica 87, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne: 6. 9. 2022