

Tekočina proti bradavicam 200 mg/50 mg/6 mg v 1 g dermalna raztopina mlečna kislina/salicilna kislina/jod

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 12 tednih, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Tekočina proti bradavicam in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Tekočina proti bradavicam
3. Kako uporabljati zdravilo Tekočina proti bradavicam
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Tekočina proti bradavicam
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Tekočina proti bradavicam in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Tekočina proti bradavicam vsebuje mlečno kislino, salicilno kislino in jod. Deluje tako, da na mestu nanosa mehča kožo in s postopnim luščenjem vrhne plasti kože omogoči odstranitev bradavic in kurjih oces.

Tekočina proti bradavicam se uporablja za odstranjevanje bradavic in kurjih oces.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 12 tednih, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Tekočina proti bradavicam

Ne uporabljajte zdravila Tekočina proti bradavicam

- če ste alergični na mlečno kislino, salicilno kislino, jod ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če je kožna bradavica ali koža okoli nje pordela, razdražena, poškodovana ali vneta,
- na bradavicah, iz katerih izraščajo dlake, kožnih znamenjih ali delih kože, ki so nenavadnega videza,
- na obrazu, analnem predelu, genitalijah ali sluznicah.

Obvestila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Tekočina proti bradavicam se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri uporabi zdravila Tekočina proti bradavicam bodite še posebej pozorni, če imate:

- sladkorno bolezen,
 - motnjo periferne cirkulacije ali moteno občutljivost rok ali nog.
- V teh primerih mora zdravljenje potekati pod zdravniškim nadzorom.

Zdravilo Tekočina proti bradavicam ne sme priti v stik s sluznicami, ker lahko povzroči draženje. Če se to zgodi, izpirajte z veliko količino vode.

Ne vdihavajte hlapov zdravila, ker lahko povzročijo omotičnost.

Otroci

Pri otrocih, starih od 2 do 12 let, se sme zdravilo Tekočina proti bradavicam uporabljati le pod skrbnim nadzorom odrasle osebe. Pred začetkom uporabe zdravila pri otrocih, starih od 2 do 4 let, je nujen posvet z zdravnikom. Uporaba zdravila pri otrocih, mlajših od 2 let, ni priporočljiva.

Druga zdravila in zdravilo Tekočina proti bradavicam

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni znano, da bi zdravilo Tekočina proti bradavicam vplivalo na učinke drugih zdravil. Študij o medsebojnem delovanju z zdravili niso izvedli.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Varnost med nosečnostjo in dojenjem ni bila ugotovljena. Ker ni zadostnih podatkov, uporaba zdravila Tekočina proti bradavicam med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Tekočina proti bradavicam vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Študij niso izvedli.

Zdravilo Tekočina proti bradavicam vsebuje etanol

To zdravilo vsebuje 250 mg alkohola (etanola) v 1 g. Lahko povzroči pekoč občutek na poškodovani koži.

3. Kako uporabljati zdravilo Tekočina proti bradavicam

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Raztopino nanesite s čopičem na prizadete dele kože 3-krat dnevno. Po treh dneh omehčajte kožo z namakanjem v topli kopeli ter previdno odluščite odmrle dele. Postopek ponavljajte do popolne odstranitve bradavice ali kurjega očesa.

Pazite, da zdravila ne nanesete na zdravo kožo okrog bradavice ali kurjega očesa. Priporočamo, da kožo v okolici prizadetega dela pred nanosom zdravila zaščitite z mastno kremo (npr. vazelinom) in tako preprečite morebiten stik zdravila z zdravo kožo.

Uporaba pri otrocih

Pri otrocih, starih od 2 do 12 let, se sme zdravilo Tekočina proti bradavicam uporabljati le pod skrbnim nadzorom odrasle osebe. Pred začetkom uporabe zdravila pri otrocih, starih od 2 do 4 let, je nujen posvet z zdravnikom. Uporaba zdravila pri otrocih, mlajših od 2 let, ni priporočljiva.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po uporabi zdravila Tekočina proti bradavicam se lahko na mestu nanosa pojavi alergijska reakcija, vnetje, bolečina, rdečina, srbenje, izpuščaj, pekoč občutek na koži, sprememba barve kože, otekline, luščenje kože, suha koža.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Tekočina proti bradavicam

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Stekleničko shranjujte tesno zaprto, pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte zaščiteno pred ognjem!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Tekočina proti bradavicam

Učinkovine so mlečna kislina, salicilna kislina in jod. 1 g dermalne raztopine vsebuje 200 mg mlečne kisline, 50 mg salicilne kisline in 6 mg joda.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so eter, etanol, voda, celulozni nitrat in kalijev jodid.

Izgled zdravila Tekočina proti bradavicam in vsebina pakiranja

Dermalna raztopina je bistra rjavordeča tekočina, lahko hlapljiva, značilnega vonja po etru in jodu. Škatla vsebuje steklen vsebnik z 10 g dermalne raztopine. Zaporka vsebnika je opremljena s čopičem za nanos zdravila.

Način in režim izdaje zdravila Tekočina proti bradavicam

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Proizvajalec

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 15. 1. 2024